



Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан



Всемирная организация
здравоохранения

Европейский регион



Финансирование
Европейского Союза



ТРЕНИНГ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)

ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ

АСТАНА, КАЗАХСТАН

ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОФИНАНСИРОВАНА ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ. ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



**ПРЕДОТВРАТИМ
РАК ШЕЙКИ МАТКИ**

ЗДОРОВЬЕ ДОЧЕРЕЙ В НАШИХ РУКАХ

КТО ДОЛЖЕН ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ ВПЧ?




9-14 ЛЕТ



ДЕВОЧКИ МЛАДШЕ 9 ЛЕТ

2022, 97, 645-672 No 50

 **World Health Organization**
Organisation mondiale de la Santé

Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire

16 DECEMBER 2022, 97th YEAR / 16 DÉCEMBRE 2022, 97^e ANNÉE
No 50, 2022, 97, 645-672
<http://www.who.int/wer>

Contents

645 Human papillomavirus vaccines: WHO position paper (2022 update)

Human papillomavirus vaccines: WHO position paper (2022 update)

Vaccins contre les papillomavirus humains: note de synthèse de l'OMS (mise à jour de 2022)

Sommaire

645 Vaccins contre les papillomavirus humains: note de synthèse de l'OMS (mise à jour de 2022)

Introduction

In accordance with its mandate to provide normative guidance to Member States on health policy matters, WHO issues a series of regularly updated position papers¹ on vaccines and combinations of vaccines against diseases that have an international public health impact. These papers are concerned primarily with the use of vaccines in large-scale vaccination programmes.

The vaccine position papers are drafted by the WHO SAGE Secretariat; they

Introduction

Conformément à son mandat, qui prévoit qu'elle fournisse aux États Membres des orientations à caractère normatif en matière de politique sanitaire, l'OMS publie une série de notes de synthèse¹ régulièrement mises à jour sur les vaccins et les associations vaccinales contre les maladies ayant une incidence sur la santé publique internationale. Ces notes portent principalement sur l'utilisation des vaccins dans le cadre de programmes de vaccination à grande échelle.

Les notes de synthèse sur les vaccins sont rédigées par le secrétariat du SAGE de l'OMS; elles

ДОКУМЕНТ ПО ПОЗИЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИН ПРОТИВ ВПЧ (2022)

[HTTPS://APPS.WHO.INT/IRIS/BITSTREAM/HANDLE/10665/365350/WER9750-ENG-FRE.PDF](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/365350/wer9750-eng-fre.pdf)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЮ

Согласно Санитарных правил Приказ № 150 от 21 сентября 2023 года

- **ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ (ПП) ВОП/ТЕРАПЕВТ ИЛИ ПЕДИАТР, ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЧА – ФЕЛЬДШЕР:**
 - **СБОР АНАМНЕЗА, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА С ТЕРМОМЕТРИЕЙ,**
 - **ДОПУСК К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ В МЕДИЦИНСКОМ ДОКУМЕНТЕ,**
 - **ДАЛЕЕ – МИС,**
 - **ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРИВИВАЕМОМУ ЛИЦУ /ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКЕ, ВОЗМОЖНЫХ РЕАКЦИЯХ И НППИ, ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТКАЗА ОТ ПРИВИВКИ.**
- **РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВРЕМЕННОМ ИЛИ ПОСТОЯННОМ МЕДИЦИНСКОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПП НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНИМАЕТ ВОП/ТЕРАПЕВТ ИЛИ ПЕДИАТР (ФЕЛЬДШЕР).**

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЮ

Приложение 2
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"
форма

➤ **ПРИВИВКИ ПРОВОДЯТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВИВОК ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ОФОРМЛЯЕТСЯ В БУМАЖНОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ.**

Информированное согласие на проведение профилактических прививок

Я _____

(ФИО (при его наличии) прививаемого лица или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

Даю согласие на получение профилактической прививки:

_____ (наименование вакцины или других иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов))

_____ (ФИО (при его наличии), дата рождения лица, которому вводится вакцина или другие иммунологические лекарственные препараты (иммунобиологические лекарственные препараты)) и подтверждаю, что проинформирован (а) о важности проведения профилактической прививки, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях на вакцину, необходимости своевременного обращения в организацию здравоохранения при развитии любых неблагоприятных проявлений после иммунизации, вызывающих беспокойство, а также о последствиях отказа от профилактических прививок.

Дата "___" _____ 20__ года

Подпись _____

Приложение 3
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"
форма

➤ **ПРИ ОТКАЗЕ ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В БУМАЖНОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 3 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ. ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ИЛИ ОТКАЗ ВНОСЯТСЯ В МИС**

Информированный отказ от проведения профилактических прививок

Я _____

(ФИО (при его наличии) прививаемого лица или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

Отказываюсь от получения профилактической прививки:

_____ (наименование вакцины или других иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов))

_____ (ФИО, дата рождения лица, которому рекомендована вакцина или другие иммунологические лекарственные препараты (иммунобиологические лекарственные препараты)) и подтверждаю, что проинформирован (а) о важности проведения профилактической прививки и последствиях отказа от профилактических прививок.

Причины отказа (отметить):

1) религиозные;

2) личные убеждения;

3) негативная информация в средствах массовой информации, социальных сетях и других интернет ресурсах;

4) побочная реакция на предыдущую дозу вакцины или другие иммунологические лекарственные препараты (иммунобиологические лекарственные препараты);

5) другие (указать) _____.

Дата "___" _____ 20__ года

Подпись _____ (прививаемого лица или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

УЧЕТ ВРЕМЕННЫХ, ДЛИТЕЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОВОДИТСЯ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 1 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ.

Приложение 1
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"

форма

Учет временных, длительных и постоянных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок

п/п	Дата регистрации мед. противопоказаний	ФИО (при его наличии) пациента	дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Домашний адрес, телефон
1	2	3	4	5	6

[Скачать](#)

(продолжение таблицы)

Место работы/учебы/организован/не организован	Медицинские противопоказания от вакцинации/против какой инфекции (указать)	Обоснование медицинского противопоказания /Диагноз заболевания	Сроки медицинских противопоказаний от проведения профилактических прививок с указанием даты			Кем оформлен медицинские противопоказания от вакцинации (ФИО (при его наличии) врача, членов врачебной комиссии)
			временный	длительный	постоянный	

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЮ

- **ОПРОС ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ ПРОВОДИТСЯ ПО ВОПРОСНИКУ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОПРОСУ ПРИВИВАЕМОГО ЛИЦА ИЛИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ, ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ГРАЖДАН, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 4 К НАСТОЯЩИМ САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ.**

Приложение
к Санитарным правилам
"Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
и проведению профилактических
прививок населению"

Вопросник для медицинских работников по опросу прививаемого лица или его родителей, или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан перед проведением профилактической прививки

Категории	Вопросы	Да и (или) нет
Обязательные вопросы	Общее состояние прививаемого лица (ребенка)? Наличие острого заболевания?	
	Наличие аллергии на какие-либо лекарства, продукты питания или вакцины?	
	Были ли серьезные реакции на введение какой-либо вакцины в прошлом?	
	Наблюдались ли судороги или патологии головного мозга и нервной системы?	
	Состоит ли прививаемое лицо (ребенок) на диспансерном учете?	

ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ?

ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ НЕ РЕКОМЕНДОВАНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

АЛЛЕРГИЯ



БЕРЕМЕННОСТЬ



ЛИХОРАДКА



НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, НАПРИМЕР ПРОСТУДА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКЦИНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВАКЦИН

№ ҚР ДСМ-146/2020

ОБЩИЕ ПОСТОЯННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (АБСОЛЮТНЫЕ)

- ✓ СИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ, В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ДАННОЙ ВАКЦИНЫ (ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 40° ВЫШЕ, СУДОРОГИ, ГИПОТОНИЧЕСКИ-ГИПОРЕАКТИВНЫЙ СИНДРОМ
- ✓ ТЯЖЕЛАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ АНАФИЛАКСИЯ) ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ИЛИ НА ЛЮБОЙ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ВАКЦИНЫ.

• ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ)

- 1) ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ (МЕНИНГИТ, ЭНЦЕФАЛИТ, МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ) – ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА СРОК ДО ОДНОГО МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ;
 - 2) ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ – **ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ – ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРТИКОСТЕРОИДАМИ;**
- 3) ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ - **ВАКЦИНАЦИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2-4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ;**
 - 4) ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРОИДОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ИММУНОСУПРЕССИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ
- 5) ОБОСТРЕНИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ - **ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ И ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД СТОЙКОЙ РЕМИССИИ;**
- 6) ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ СУДОРОГИ ИЛИ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ – **ВАКЦИНАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПОЛНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ.**

СОСТОЯНИЯ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ОШИБОЧНО СЧИТАЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ

ВАКЦИНА	ВАКЦИНА СОСТОЯНИЯ, КОТОРЫЕ НЕРЕДКО ОШИБОЧНО СЧИТАЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ (Т.Е. ПРИ ЭТИХ СОСТОЯНИЯХ ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО ПРОВОДИТЬ)
ДЛЯ ВСЕХ ВАКЦИН: АЦКДС, АДС, АЦКДС-М, ОПВ, КПК, НІВ, ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ, РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПКВ, ПРОТИВ ВПЧ	<ul style="list-style-type: none">❖ ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ С ЛИХОРАДКОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ ЛЕГКАЯ ИЛИ УМЕРЕННАЯ МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ (Т.Е. ПРИПУХЛОСТЬ, ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЕЗНЕННОСТЬ); НЕВЫСОКАЯ ИЛИ УМЕРЕННО ВЫСОКАЯ ЛИХОРАДКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ❖ ОТСУТСТВИЕ ОСМОТРА ВРАЧОМ ВНЕШНЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА❖ ПРОВЕДЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ❖ ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ❖ НЕДАВНИЙ КОНТАКТ С ИНФЕКЦИЕЙ❖ АЛЛЕРГИЯ НА ПЕНИЦИЛЛИН В АНАМНЕЗЕ, ДРУГИЕ ВИДЫ АЛЛЕРГИЙ (НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНАМИ), НАЛИЧИЕ РОДСТВЕННИКОВ С АЛЛЕРГИЯМИ ИЛИ ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
ВПЧ	<ul style="list-style-type: none">❖ ИММУНОСУПРЕССИЯ❖ ПОЛУЧЕННЫЕ РАНЕЕ СПОРНЫЕ ИЛИ АНОМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПО ПАПАНИКОЛАУ❖ ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВПЧ ИНФЕКЦИЯ❖ ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ❖ ГЕНИТАЛЬНЫЕ КОНДИЛОМЫ В АНАМНЕЗЕ


ВЫВОДЫ ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ВАКЦИНАЦИИ

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО **РЕДКО:**
- **ТЯЖЕЛАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (НАПРИМЕР, АНАФИЛАКСИЯ) ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ИЛИ НА ЛЮБОЙ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ВАКЦИНЫ**
- **БЕРЕМЕННОСТЬ**
- **ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ИЛИ ТЯЖЕЛОЕ,**
- **С ЛИХОРАДКОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ**
- **ДАЖЕ В СОМНИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ СООТНОШЕНИЕ РИСКА И ПОЛЬЗЫ ОБЫЧНО УКАЗЫВАЕТ НА ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ИНФИЦИРОВАНИИ**

ВЫВОДЫ ПО ПРОТИВПОКАЗАНИЯМ К ВАКЦИНАЦИИ

- Решение о проведении или отсрочке вакцинации в связи с имеющимся на момент вакцинации или недавним острым заболеванием принимается с учетом тяжести симптоматики и этиологии состояния.
- Было доказано, что вакцины безопасны и эффективны у людей с легкими заболеваниями. Вакцинацию не следует откладывать из-за легкого заболевания верхних дыхательных путей или другого острого заболевания с лихорадкой или без нее, но при наличии острого заболевания средней тяжести или тяжелого, прививку целесообразно отсрочить. Такая мера предосторожности позволит избежать сложностей при распознавании проявлений уже имеющегося заболевания и возможных неблагоприятных проявлений после иммунизации, а также предупреждает наложение побочных проявлений после вакцинации на уже имеющееся заболевание.
- После скрининга лиц с острым заболеванием средней тяжести или тяжелого на предмет наличия противопоказаний следует провести их вакцинацию сразу же после улучшения состояния. Непроведение прививок у детей с легкими заболеваниями может стать барьером к полноценному проведению вакцинации. Следует использовать любую возможность для проведения вакцинации в соответствии с календарем прививок, особенно у тех лиц, чей регулярный контакт с медицинскими службами не может быть гарантирован.
- Проведение врачебного осмотра и таких процедур, как измерение температуры, не является обязательным для вакцинации лиц, выглядящих здоровыми. Медработник должен спросить родителя или законного представителя ребенка о состоянии здоровья вакцинируемого.
- **Если у ребенка заболевание средней тяжести или тяжелое, то следует отложить вакцинацию.**

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИН И ЛОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ



@FEDEMARTINON, GENVIP 2021



РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ


КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ К* РЕШИЛО ЗАПУСТИТЬ В ШКОЛАХ ПРОГРАММУ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ ДЛЯ ВСЕХ ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 11 ЛЕТ.

ВЫ - РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ В СТРАНЕ А. В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ВЫ ПРОВОДИЛИ ВЫЕЗДНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ СЕССИИ В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ВАШЕГО ГОРОДА.

МАМА ОДНОЙ ИЗ ДЕВОЧЕК 11 ЛЕТ, Г-ЖА Л. ПРИШЛА В ШКОЛУ, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ДОЧЬ ПОСЛЕ УРОКОВ. В ЦЕЛОМ ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ИММУНИЗАЦИИ И УЖЕ ПРИВИЛА СВОЮ ДОЧЬ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ АНТИГЕНАМИ, ОТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ ОНА ОТКАЗАЛАСЬ.

ПОСКОЛЬКУ ОНА СПЕШИЛА, ТО РЕШИЛА ЗАДАТЬ ВАМ ПАРУ ВОПРОСОВ О ПРИВИВОЧНОЙ СЕССИИ И ВАКЦИНЕ.



Г-ЖА Л. СПРАШИВАЕТ:

- **«МОЯ ДОЧЬ СКЛОННА К АЛЛЕРГИИ И ОБЫЧНО НА ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ МЫ ХОДИМ В ПОЛИКЛИНИКУ, И НА ПРИВИВКУ ТОЖЕ. БЕЗОПАСНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ПРЯМО ЗДЕСЬ, В ШКОЛЕ?»**



ВОПРОС #1

ЧТО ВЫ ОТВЕТИТЕ Г-ЖЕ Л.?

**НЕТ. УЧИТЫВАЯ АЛЛЕРГИЮ В АНАМНЕЗЕ ЕЕ НУЖНО
ВАКЦИНИРОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОЛИКЛИНИКЕ.**


**ДА. ВАКЦИНАЦИЯ ВНЕ СТАЦИОНАРА БЕЗОПАСНА И ПРОВОДИТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ**

ВОПРОС #1

ЧТО ВЫ ОТВЕТИТЕ Г-ЖЕ Л.?



**НЕТ. УЧИТЫВАЯ АЛЛЕРГИЮ В АНАМНЕЗЕ ЕЕ
НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬ ТОЛЬКО В
СТАЦИОНАРЕ.**



**ДА. ВАКЦИНАЦИЯ ВНЕ СТАЦИОНАРА
БЕЗОПАСНА И ПРОВОДИТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ**

ГОСПОЖА Л. СПРАШИВАЕТ:

- **«ВПЧ-ВАКЦИНЫ ВЕДЬ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВЫЕ, НЕ ТАК ЛИ? А КАКИЕ У НИХ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ? И КАК ВЫ СМОЖЕТЕ СПРАВИТЬСЯ В ШКОЛЕ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПОБОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ?»**

ВОПРОС #2

- **КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АРГУМЕНТ С Г-ЖОЙ Л.?**





ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ. ВПЧ ВАКЦИНЫ НОВЫЕ И У НАС НЕДОСТАТОЧНО ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАТЬ ЧЕТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВПЧ ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТ 70 ДО 90% БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВПЧ



ВПЧ ВАКЦИНЫ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, БЕЗОПАСНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ В СОГЛАСНО ВСЕСТОРОННИМ И НАДЕЖНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ

ГККБВ РАССМОТРЕЛ ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ БЕЗОПАСНОСТИ ВПЧ ВАКЦИН И НЕ ОБНАРУЖИЛ НИКАКИХ ВОПРОСОВ В ОТНОШЕНИИ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫ ИЗМЕНИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ.

■ КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АРГУМЕНТ С Г-ЖОЙ Л.?

-  ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ. ВПЧ ВАКЦИНЫ НОВЫЕ И У НАС НЕДОСТАТОЧНО ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДАТЬ ЧЕТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
-  УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВПЧ ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТ 70 ДО 90% БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВПЧ
-  ВПЧ ВАКЦИНЫ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, БЕЗОПАСНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ В СОГЛАСНО ВСЕСТОРОННИМ И НАДЕЖНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ
-  ГККБВ РАССМОТРЕЛ ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ БЕЗОПАСНОСТИ ВПЧ ВАКЦИН И НЕ ОБНАРУЖИЛ НИКАКИХ ВОПРОСОВ В ОТНОШЕНИИ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫ ИЗМЕНИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ВАКЦИНАХ ПРОТИВ ВПЧ

-  **ВПЕРВЫЕ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ БЫЛА РЕКОМЕНДОВАНА В 2006 ГОДУ. С ТЕХ ПОР ПО ДАННЫМ США СЛУЧАИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ТИПАМИ ВПЧ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ БОЛЬШИНСТВО ВИДОВ РАКА И ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПАПИЛЛОМЫ, СОКРАТИЛИСЬ НА 88% СРЕДИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА И НА 81% СРЕДИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН.**
-  **ПО СОСТОЯНИЮ НА 2024 ГОД ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ БЫЛА ВНЕДРЕНА В 135 СТРАНАХ, ОБЕСПЕЧИВ ВОЗМОЖНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ВО ВСЕМ МИРЕ КАЖДОЙ ТРЕТЬЕЙ ДЕВОЧКИ В ВОЗРАСТЕ 9-14 ЛЕТ.**

ВОПРОСЫ Г-ЖИ Л.:

✓ **СКАЖИТЕ, А КАКИЕ У ЭТОЙ ВАКЦИНЫ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ?**

✓ **И КАК ВЫ СМОЖЕТЕ СПРАВИТЬСЯ В ШКОЛЕ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПОБОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ?”**



ВОПРОС #3

- **В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ Г-ЖИ Л., КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕВЕРНО?**

ВПЧ ВАКЦИНЫ БЕЗОПАСНЫ. КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ, ЧТО ОНИ ХОРОШО ПЕРЕНОСЯТСЯ И НЕТ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ С ИХ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

ПОДРОСТКОВ БУДУТ ПРИВИВАТЬ В ГРУППАХ ПО 5 ЧЕЛОВЕК ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ И ПОВЫСИТЬ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.

РЕАКТОГЕННОСТЬ (МЕСТНАЯ И ОБЩАЯ) ОБЫЧНЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ПОБОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ.

В ЧРЕЗВЫЧАЙНО РЕДКИХ СЛУЧАЯХ ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АНАФИЛАКТИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.

ВОПРОС #3

- В отношении вопросов г-жи Л., какое утверждение НЕВЕРНО?

- ВПЧ вакцины безопасны. Клинические испытания продемонстрировали, что они хорошо переносятся и нет больших проблем с их безопасностью.
- Подростков будут прививать в группах по 5 человек чтобы уменьшить время и повысить приемлемость вакцинации.
- Реактогенность (местная и общая) обычные и ожидаемые побочные проявления вакцинации.
- В чрезвычайно редких случаях вакцинация может вызвать анафилактическую реакцию.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА ВПЧ-ВАКЦИНУ

- **КАК ПРАВИЛО, ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ НОСЯТ МЯГКИЙ ХАРАКТЕР И БЫСТРО ПРОХОДЯТ.**
- **НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕАКЦИИ:**
 - **БОЛЬ В МЕСТЕ ИНЪЕКЦИИ;**
 - **ПОКРАСНЕНИЕ;**
 - **ОТЕК.**

Г-ЖА Л. СПРАШИВАЕТ:

**«РАЗ ВЫ ОТВЕТИЛИ НА ВСЕ МОИ ВОПРОСЫ, Я
ПЕРЕДУМАЛА И РЕШИЛА НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ПРИВИВКУ...
НО МЫ НЕМНОГО СПЕШИМ. ВЫ МОЖЕТЕ ПРИВИТЬ МОЮ
ДОЧЬ ПРЯМО СЕЙЧАС? ВОТ ОНА, СТОИТ ПЕРЕД ВАМИ И
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЯМО СТОЯ ЕЕ И ПРИВИТЬ. А ПОСЛЕ
ПРИВИВКИ НАМ НАДО БЕЖАТЬ, ТАК КАК У НАС ЕСТЬ
ДРУГИЕ ДЕЛА...»**


ВОПРОС #4

НЕТ. ЗА ПАЦИЕНТАМИ НЕОБХОДИМО НАБЛЮДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ; ОНИ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ (ИЛИ ДАЖЕ ЛЕЖАТЬ)

ДА. СРОЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНА В ЭТОМ СЛУЧАЕ. Г-ЖА Л. МОЖЕТ ПЕРЕДУМАТЬ; У РЕБЕНКА НЕТ БЫЛО ПППИ - ЭТО БЕЗОПАСНО

ВОПРОС #5

■ ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ Г-ЖИ Л.?

 **НЕТ. ЗА ПАЦИЕНТАМИ НЕОБХОДИМО НАБЛЮДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ; ОНИ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ (ИЛИ ДАЖЕ ЛЕЖАТЬ)**

 **ДА. СРОЧНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНА В ЭТОМ СЛУЧАЕ. Г-ЖА Л. МОЖЕТ ПЕРЕДУМАТЬ; У РЕБЕНКА НЕТ БЫЛО ПППИ - ЭТО БЕЗОПАСНО**

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА ПРИ ИММУНИЗАЦИИ

- **КОГДА У ЧЕЛОВЕКА СНИЖАЕТСЯ ПРИТОК КРОВИ К ГОЛОВЕ, У НЕГО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ СИНКОПЕ ИЛИ ВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ. НО ОБМОРОК МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН И ДРУГИМИ ПРИЧИНАМИ - ОБЫЧНО ОН СЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬ ИЛИ БЕСПОКОЙСТВО.**
- **ИНОГДА ОБМОРОК МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ.**
- **ЕСЛИ В МОМЕНТ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕК НЕ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ ИЛИ ЛЕЖА, ОН МОЖЕТ УПАСТЬ И ТРАВМИРОВАТЬСЯ.**




ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

- **ИМЕННО ПОЭТОМУ, ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ВАКЦИНАЦИИ МЕДРАБОТНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ПАЦИЕНТАМ СИДЕТЬ НА СТУЛЕ ИЛИ ЛЕЖАТЬ НА КУШЕТКЕ.**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МЕДРАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ.**



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

- В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕПРИНЯТОЙ ПРАКТИКОЙ, ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЛЮБОЙ ВАКЦИНЫ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ — ЭТО ПОЗВОЛИТ ВЫЯВИТЬ РЕАКЦИЮ НА ВАКЦИНУ И ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ.
- ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПОПРОСИТЕ ПАЦИЕНТА НА 30 МИНУТ ОСТАТЬСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ ИЛИ В ЦЕНТРЕ ВАКЦИНАЦИИ, ГДЕ ЕСТЬ МЕДРАБОТНИКИ, НА СЛУЧАЙ ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ



- ✓ ВАКЦИНИРОВАТЬ ПАЦИЕНТОВ ПО ОДНОМУ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОМ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ПОМЕЩЕНИИ.
- ✓ ВО ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ (ИЛИ ДАЖЕ ЛЕЖА).
- ✓ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ.
- ✓ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХОГЕННОЙ РЕАКЦИИ НА БОЯЗНЬ «УКОЛА» ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВИВОЧНОЙ КОМПАНИИ В ШКОЛАХ, ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ ПРИНЦИП «СКВОЗНОГО КОРИДОРА»



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2

ВЫ – ПРАКТИКУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ/ПЕДИАТР В СТРАНЕ К*.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ, В ВАШ КАБИНЕТ ОБРАТИЛАСЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 16-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА.

ОНА НИКОГДА НЕ ПРИВИВАЛАСЬ ПРОТИВ ВПЧ И ИСПЫТЫВАЕТ НЕКОТОРЫЕ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОЙ ВАКЦИНЫ.



ЧТО У ВАС СПРОСИЛА ДЕВУШКА:

- 1. Я УСЛЫШАЛА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, ЧТО НАЧИНАЕТСЯ КАМПАНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 11 ЛЕТ. Я НЕ ПОПАДАЮ В ЭТУ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО СВЯЗАНО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВАКЦИНЫ?**
- 2. МОЯ ПОДРУГА СПРАШИВАЕТ — БЕЗОПАСНО ЛИ, И НУЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ТЫ УЖЕ ВЕДЕШЬ ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ?**
- 3. А ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА УЖЕ ЕСТЬ ВИРУС ВПЧ, ПОМОЖЕТ ЛИ ЕМУ ВПЧ-ВАКЦИНА?**

5 МИНУТ НА ДИСКУССИЮ

ВОПРОС 1: ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ

- ЭТО НЕ СВЯЗАНО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ.
- ВСЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ У ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ ИЛИ СТАРШЕ, И ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 26 ИЛИ 45 ЛЕТ. НЕКОТОРЫЕ ВПЧ-ВАКЦИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ. КАК ПРАВИЛО, ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ 45 ЛЕТ И СТАРШЕ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ.
- В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, ДЛЯ КОТОРОЙ РЕКОМЕНДОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ — ЭТО ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ 9-14 ЛЕТ. ВСЕ СТРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ ДЛЯ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИВИВОЧНЫХ КАМПАНИЯХ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ (ФИНАНСИРОВАНИЕ, ДОСТУПНОСТЬ ДРУГИХ УСЛУГ И Т.Д.)
- **В КАЗАХСТАНЕ** С 2024 ГОДА В РАМКАХ ГОБМП БУДЕТ ДОСТУПНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ ДЛЯ **ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ — 11 ЛЕТ** (ВАКЦИНАЦИЯ ДЕВОЧЕК 12-14 ЛЕТ БУДЕТ РАССМОТРЕНА С УЧЕТОМ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕМА ВАКЦИН ПРОТИВ ВПЧ).

ВОПРОС 2: ВАКЦИНАЦИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ (ч. 1)

- **МАЛЬЧИКАМ И ДЕВОЧКАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ.**
- **ВПЧ – ЭТО ГРУППА ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 РОДСТВЕННЫХ ВИРУСОВ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЛИЗИСТУЮ. ОБЫЧНО У ЧЕЛОВЕКА НЕТ ВПЧ ВСЕХ ТИПОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВАКЦИНЕ.**

ВОПРОС 2: ВАКЦИНАЦИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА **ПОЛОВОЙ** ЖИЗНИ (ч. 2)

- **ИТАК, ПОВТОРИМ, ОБЫЧНО У ЧЕЛОВЕКА НЕТ ВСЕХ ТИПОВ ВПЧ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВАКЦИНЕ. ПОЭТОМУ ВАКЦИНА МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ТЕХ ТИПОВ, С КОТОРЫМИ ОН ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ.**
- **ОДНАКО ВАКЦИНА НЕ ПОМОЖЕТ ВЫЛЕЧИТЬ ИЛИ ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ТЕХ ТИПОВ ВПЧ, ВОЗДЕЙСТВИЮ КОТОРЫХ ОН УЖЕ БЫЛ ПОДВЕРЖЕН.**

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ

- НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
- ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ЗППП), НАПРИМЕР
- СИФИЛИСА, ХЛАМИДИОЗА, ГОНОРЕИ И ГЕРПЕСА, И ОНА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА ОТ ТЕХ ТИПОВ ВПЧ, КОТОРЫМИ ОН УЖЕ ИНФИЦИРОВАН. ПОЭТОМУ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗППП.



**СОХРАНЯЙТЕ
СПОКОЙСТВИЕ И
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ**

